

PARA ZONAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES TROPICALES



GOIBI ANTIMOSQUITOS XTREME SPRAY

Spray de 75 ml con cierre de seguridad.
(A partir de 2 años)
45% DEET Dietiltoluamida.
Protección 8 horas.



GOIBI ANTIMOSQUITOS XTREME TOALLITAS

Toallitas individuales para bolso de mano.
(A partir de 2 años)
45% DEET Dietiltoluamida.
Protección 8 horas.

En niños de 2 a 12 años solo deberá usarse de forma restringida.

El DEET* ha sido reconocido en todo el mundo como el ingrediente más eficiente en repelentes.
Se considera como el repelente patrón con el que se comparan los demás.

*N-dietil-3-metilbenzamida (anteriormente N, N-dietil-m-toluamida).
FUENTE: Catálogo de Parafarmacia. Ed. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 2007.

0007700 - FEBRERO 2015

CONOCE EL RESTO DE PRODUCTOS GOIBI ANTIMOSQUITOS DE CINFA



GOIBI ANTIMOSQUITOS NATURE BARRA

Eficacia probada frente al mosquito tigre.
(A partir de 2 años)
40% Citrodíol.
Protección 4-6 horas.

GOIBI ANTIMOSQUITOS NATURE SPRAY

Eficacia probada frente al mosquito tigre.
(A partir de 2 años)
40% Citrodíol.
Protección 4-6 horas.



GOIBI ANTIMOSQUITOS FAMILIA SPRAY

La concentración adecuada en condiciones normales.
(A partir de 2 años)
18% DEET Dietiltoluamida.
Protección 6-8 horas.

A partir de 1 año



GOIBI ANTIMOSQUITOS INFANTIL SPRAY

La protección para niños.
(A partir de 1 año)
1,6% IR3535 3 (N-butil-N-acetil) Aminopropionato de Etilo.
Protección 6 horas.

GOIBI

La solución profesional para los mosquitos

antimosquitos xtreme

CONSEJOS GENERALES PARA VIAJES TROPICALES



www.goibi.es

 cinfa



SOL Y ALTAS TEMPERATURAS

Protégete del sol y el calor en países tropicales, ya que pueden provocar deshidratación e insolaciones.



INSECTOS Y PICADURAS

Recuerda que enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla o el paludismo se transmiten a través de las picaduras de mosquitos. Es importante seguir estos consejos:

1. Lleva siempre contigo un repelente de insectos específico para su uso en zonas tropicales, normalmente a base de DEET (Dietiltoluamida). Sigue las instrucciones del fabricante, especialmente las relacionadas con niños.
2. Los mosquitos pican habitualmente entre el anochecer y el amanecer, así que si sales en ese periodo, deberás llevar ropa de manga larga, pantalones largos y evitar colores oscuros ya que atraen a los mosquitos.
3. Utiliza mosquiteras impregnadas de Permetrina o Deltametrina, e insecticidas en la habitación.



ROPA Y CALZADO

Utiliza ropa cómoda de fibras naturales, y calzado ventilado para evitar infecciones por hongos.

Si lavas tu ropa y la secas al aire, pláncchala con mucho calor. Comprueba la ropa, el calzado y las sábanas ya que puede haber insectos escondidos.



PRIMEROS AUXILIOS

Lleva siempre un botiquín de viaje con desinfectante, material de cura, antiidiarréicos y antihistamínicos para casos de alergias.



SÍNDROME CLASE TURISTA

Para evitar el Síndrome de la Clase Turista (SCT) en vuelos de más de dos horas, utiliza una media o calcetín de compresión normal.



BEBIDAS Y ALIMENTOS

Ten mucho cuidado con la comida y la bebida, ya que enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea o la hepatitis A se transmiten por el agua y los alimentos contaminados.

1. Si vas a comer hortalizas frescas o fruta, deberás pelarlas o mantenerlas media hora en agua tratada con lejía apta para uso humano.
2. Consume verduras, carnes y pescados suficientemente cocinados. No tomes moluscos crudos.
3. Ten cuidado con la repostería y los helados. No consumas leche ni sus derivados sin higienizar.
4. Bebe únicamente agua y bebidas embotelladas. Evita hielo si no procede de agua higienizada.



CUIDADOS ESPECIALES

Niños, embarazadas y ancianos deben tener más cuidado a la hora de realizar sus viajes.

Prepara tu viaje con antelación y no olvides visitar la página web de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y Consumo www.msc.es y el Centro de Vacunación Internacional de tu comunidad.

¡Que disfrutes mucho de tu viaje!

EFICACIA DEL DEET 45%

	NOMBRE	ENFERMEDADES QUE TRANSMITE	LOCALIZACIÓN	CUÁNDO PICA	PICADURA
	CULEX (Mosquito común)	Filariosis, Jap B, encefalitis	Todo el mundo	Por la tarde/noche. Interior/Exterior. Medio urbano rural.	No suele ser dolorosa. Puede producir reacciones locales de pocas horas o días.
	TÁBANO	Filariasis ocular, Tumor de Calabar	Europa, norte de Asia y parte noroccidental de África	De día. Exterior. Medio rural.	Dolorosa. Puede producir sensación de pinchazos, seguidos de prurito e hinchazón.
	ANOPHELES	Malaria, filariosis	Asia, África, América y Pacífico occidental	De noche. Interior/Exterior. Principalmente en medio rural.	No suele ser dolorosa. Puede producir reacciones locales de pocas horas o días.
	AEDES	Dengue, fiebre amarilla, filariosis, encefalitis, encefalitis vírica	Asia, África, América y Pacífico occidental	De día. Interior/Exterior. Medio urbano/rural.	No suele ser dolorosa. Suele producir prurito local de pocas horas o varios días.
	MOSCA NEGRA	Oncocercosis	África. En Europa apañaciones ocasionales (por ejemplo España)	De día. Exterior. Medio rural.	Dolorosa. Puede producir pinchazos, seguidos de prurito, hinchazón y ulceración.
	MOSQUITO TIGRE	Dengue y malaria en países de origen. En España no transmite enfermedades.	Asia, América, Europa y Pacífico	De día. Interior/Exterior. Medio urbano/rural.	Mordedura dolorosa, incluso a través de la ropa.
	MOSCA TSÉ-TSÉ	Enfermedad del sueño	África	De día. Exterior (vehículos). Medio urbano rural.	Muy dolorosa. Normalmente produce hinchazones alérgicas.
	MOSCA DE LA ARENA (Phlebotomus)	Leishmaniosis, fiebre de la mosca de la arena	África, Asia, América y cuenca mediterránea	Al atardecer. Interior/Exterior. Medio urbano rural.	Causa dolor seguido de prurito. Aspecto similar a la varicela. Duración de una semana.
	MOSCA GÉNERO CHIRONOMIDAE	Molestias (suelen atacar en enjambres)	África, Asia, América y Pacífico Occidental. Climas moderados (por ejemplo España)	Al atardecer. Exterior. Medio rural.	Pinchazo agudo, a menudo seguido de hinchazón molesta.
	MOSCA DE LOS ESTABLOS	Sólo a animales (no enfermedades humanas)	Todo el mundo	De día (cerca de establos).	Pinchazo agudo. A menudo seguido de prurito.
	CHINCHE DE TRIATOMA (Reduviidae)	Enfermedad del chagas	América	De noche. En la cama. Medio urbano/rural.	Normalmente indolora. Puede producir urticaria si reacciona a la saliva que el animal inyecta.
	CHINCHE COMÚN	Insomnio	Todo el mundo	De noche. En la cama. Medio urbano/rural.	Muy dolorosa y duradera. A veces causa problemas cutáneos por infección.
	GARRAPATA	Fiebre, tífus, enf. de Lyme o borreliosis, encefalitis	Todo el mundo	De día (pastos altos). De noche (cuevas). Medio rural.	Oscila entre indolora y muy dolorosa, con hemorragia y ulceración.
	PULGA	Peste bubónica, tungiasis	Todo el mundo	De día/noche. Interior. Medio urbano/rural.	Oscila entre reacciones no perceptibles y dolor inmediato y formación de pápulas color rosa.
	PIOJO	Tífus, fiebres	Todo el mundo	De día/Noche. Interior/Exterior. Medio urbano/rural.	No suele ser dolorosa, pero puede causar dolores cutáneos que se agravan al rascarse.

Fuente: Manual de parasitología: morfología y biología de los parásitos de interés sanitario (2007), Jaime Gállego Berenguer.