

CONOCE EL RESTO DE PRODUCTOS GOIBI ANTIMOSQUITOS DE CINFA



GOIBI ANTIMOSQUITOS FAMILIA SPRAY

La concentración adecuada en condiciones normales.

(A partir de 2 años)
18% DEET Dietiltoluamida.
Protección 6-8 horas.



GOIBI ANTIMOSQUITOS PEDIÁTRICO SPRAY

Eficacia probada frente al mosquito tigre. Testado en pieles sensibles.

(A partir de 1 año)
10% IR3535 (N-butil-N-acetil) Aminopropionato de Etilo.
Protección 6 horas.



GOIBI ANTIMOSQUITOS CITRIODIOL® SPRAY

Eficacia probada frente al mosquito tigre.

(A partir de 3 años)
40% Citriodiol®.
Protección 4,5 horas.



GOIBI ANTIMOSQUITOS NATURE BARRA

Eficacia probada frente al mosquito tigre.

(A partir de 2 años)
40% Citriodiol®.
Protección 4-6 horas.

PARA ZONAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES TROPICALES



GOIBI ANTIMOSQUITOS XTREME SPRAY

Spray de 75 ml con cierre de seguridad.

(A partir de 2 años)
45% DEET Dietiltoluamida.
Protección 8 horas.



GOIBI ANTIMOSQUITOS XTREME TOALLITAS

Toallitas individuales para bolso de mano.

(A partir de 2 años)
45% DEET Dietiltoluamida.
Protección 8 horas.



- ✓ Con estudios de eficacia Repelente frente a Aedes albopictus (mosquito tigre).
- ✓ Con estudios de eficacia Repelente frente a Aedes aegypti.
- ✓ Recomendado para embarazadas según la OMS (MSSSI, VIAJEROS, 2016).

VENTA EN FARMACIAS

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

*N-dietil-3-metilbenzamida (anteriormente N, N-dietil-m-toluamida).

GOIBI

La solución profesional para los mosquitos

CONSEJOS GENERALES PARA VIAJES TROPICALES



www.goibi.es

cinfa

SOL Y ALTAS TEMPERATURAS

Protégete del sol y del calor en países tropicales, ya que pueden provocar deshidratación e insolaciones.

El protector solar debe aplicarse antes del repelente de mosquitos.

INSECTOS Y PICADURAS

Recuerda que enfermedades como el virus zika, el dengue, la fiebre amarilla o el paludismo se transmiten a través de las picaduras de mosquitos. Es importante seguir estos consejos:

1. Lleva siempre contigo un repelente de insectos específico para su uso en zonas tropicales, normalmente a base de DEET (Dietiltoluamida). Sigue las instrucciones del fabricante, especialmente las relacionadas con niños.
2. Los mosquitos pican habitualmente entre el anochecer y el amanecer, así que si sales en ese periodo, deberás llevar ropa de manga larga, pantalones largos y evitar colores oscuros ya que atraen a los mosquitos.
3. Utiliza mosquiteras impregnadas de Permetrina o Deltametrina, e insecticidas en la habitación.

ROPA Y CALZADO

Utiliza ropa cómoda de fibras naturales, y calzado ventilado para evitar infecciones por hongos.

Si lavas tu ropa y la secas al aire, pláncchala con mucho calor. Comprueba la ropa, el calzado y las sábanas ya que puede haber insectos escondidos.

PRIMEROS AUXILIOS

Lleva siempre un botiquín de viaje con desinfectante, material de cura, antidiarréicos y antihistamínicos para casos de alergias.

SÍNDROME CLASE TURISTA

Para evitar el Síndrome de la Clase Turista (SCT) en vuelos de más de dos horas, utiliza una media o calcetín de compresión normal.

BEBIDAS Y ALIMENTOS

Ten mucho cuidado con la comida y la bebida, ya que enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea o la hepatitis A se transmiten por el agua y los alimentos contaminados.

1. Si vas a comer hortalizas frescas o fruta, deberás pelarlas o mantenerlas media hora en agua tratada con lejía apta para uso humano.
2. Consume verduras, carnes y pescados suficientemente cocinados. No tomes moluscos crudos.
3. Ten cuidado con la repostería y los helados. No consumas leche ni sus derivados sin higienizar.
4. Bebe únicamente agua y bebidas embotelladas. Evita hielo si no procede de agua higienizada.

CUIDADOS ESPECIALES

Niños, ancianos y embarazadas deben tener más cuidado a la hora de realizar sus viajes.

Prepara tu viaje con antelación y no olvides visitar la página web de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y Consumo www.msc.es y el Centro de Vacunación Internacional de tu comunidad. ¡Que disfrutes mucho de tu viaje!

EFICACIA DEL DEET 45%

Según Bibliografía.

	NOMBRE	ENFERMEDADES QUE TRANSMITE	LOCALIZACIÓN	CUÁNDO PICA	PICADURA
	CULEX (Mosquito común)	Filariosis, Jap B, encefalitis	Todo el mundo	Por la tarde/noche. Interior/Exterior. Medio urbano/rural.	No suele ser dolorosa. Puede producir reacciones locales de pocas horas o días.
	TÁBANO	Filariasis ocular, Tumor de Calabar	Europa, norte de Asia y parte noroccidental de África	De día. Exterior. Medio rural.	Dolorosa. Puede producir sensación de pinchazos, seguidos de prurito e hinchazón.
	ANOPHELES	Malaria, filariosis	Asia, África, América y Pacífico occidental	De noche. Interior/Exterior. Principalmente en medio rural.	No suele ser dolorosa. Puede producir reacciones locales de pocas horas o días.
	AEDES	Dengue, fiebre amarilla, filariosis, encefalitis, encefalitis vírica	Asia, África, América y Pacífico occidental	De día. Interior/Exterior. Medio urbano/rural.	No suele ser dolorosa. Suele producir prurito local de pocas horas o varios días.
	MOSCA NEGRA	Oncocercosis	África, En Europa apañaciones ocasionales (por ejemplo España)	De día. Exterior. Medio rural.	Dolorosa. Puede producir pinchazos, seguidos de prurito, hinchazón y ulceración.
	MOSQUITO TIGRE	Dengue y malaria en países de origen. En España no transmite enfermedades.	Asia, América, Europa y Pacífico	De día. Interior/Exterior. Medio urbano/rural.	Mordedura dolorosa, incluso a través de la ropa.
	MOSCA TSÉ-TSÉ	Enfermedad del sueño	África	De día. Exterior (vehículos). Medio urbano/rural.	Muy dolorosa. Normalmente produce hinchazones alérgicas.
	MOSCA DE LA ARENA (Phlebotomus)	Leishmaniosis, fiebre de la arena	África, Asia, América y cuenca mediterránea	Al atardecer. Interior/Exterior. Medio urbano/rural.	Causa dolor seguido de prurito. Aspecto similar a la varicela. Duración de una semana.
	MOSCA GÉNERO CHIRONOMIDAE	Molestias (suelen atacar en enjambres)	África, Asia, América y Pacífico Occidental. Cimas moderadas (por ejemplo España)	Al atardecer. Exterior. Medio rural.	Pinchazo agudo, a menudo seguido de hinchazón molesta.
	MOSCA DE LOS ESTABLOS	Sólo a animales (no enfermedades humanas)	Todo el mundo	De día (cerca de establos).	Pinchazo agudo. A menudo seguido de prurito.
	CHINCHE DE TRIATOMA (Reduviidae)	Enfermedad del chagas	América	De noche. En la cama. Medio urbano/rural.	Normalmente indolora. Puede producir urticaria si reacciona a la saliva que el animal inyecta.
	CHINCHE COMÚN	Insomnio	Todo el mundo	De noche. En la cama. Medio urbano/rural.	Muy dolorosa y duradera. A veces causa problemas cutáneos por infección.
	GARRAPATA	Fiebre, tífus, enf. de Lyme o borreliosis, encefalitis	Todo el mundo	De día (pastos altos). De noche (cuevas). Medio rural.	Oscila entre indolora y muy dolorosa, con hemorragia y ulceración.
	PULGA	Peste bubónica, tungiasis	Todo el mundo	De día/noche. Interior. Medio urbano/rural.	Oscila entre reacciones no perceptibles y dolor inmediato y formación de pápulas color rosa.
	PIOJO	Tífus, fiebres	Todo el mundo	De día/Noche. Interior/Exterior. Medio urbano/rural.	No suele ser dolorosa, pero puede causar dolores cutáneos que se agravan al rascarse.